

Les mésanges de Blaise

Chronique naturaliste

Il y a en France 6 espèces de mésange vraies : mésanges charbonnière, bleue, noire, huppée, nonnette et boréale. La mésange à longue queue n'est pas une vraie mésange d'un point de vue phylogénétique. Parmi ces espèces, deux sont présentes à Blaise, la charbonnière (18-22 grammes) et la bleue (10-12 grammes). Ce sont les plus communes en France car elles vivent en forêt de feuillus mais aussi dans les villages, les parcs et les jardins. La mésange noire a disparu de Blaise le jour où les grands pins entre les bâtiments 1 et 2 ont été coupés, car c'est une espèce qui aime bien les conifères. Les mésanges sont insectivores mais en hiver elles peuvent compléter avec des fruits ou des graines.



Mésange bleue à gauche et charbonnière à droite (photos A. Clamens)

Les mésanges sont des oiseaux cavernicoles car ils établissent leur nid dans des cavités, généralement des trous des arbres mais aussi pour la bleue et la charbonnière des trous dans des murs, des boîtes aux lettres abandonnée, des nichoirs (elles n'y résistent pas). La noire qui vit dans les conifères pauvres en cavités fait souvent son nid dans un trou au sol. A Blaise, la mésange bleue est présente mais ne niche pas alors que la charbonnière niche tous les ans. La vétusté des bâtiments lui permet de trouver facilement un trou pour son nid, comme une sortie d'aération dont la grille est cassée.

Les mésanges sont de grosses pondeuses. Dans des milieux riches en nourriture elles peuvent avoir des pontes de 8 à 12 œufs (maxi 14). A Blaise, il y a peu d'insectes, elles font plutôt 4 à 6 œufs. La femelle pond un œuf par jour. Donc pour 10 œufs elle pond un œuf tous les matins pendant 10 jours. Comme un œuf fait 10% de son poids, calculez ce que ça ferait pour vous !! Elle ne commence de couvrir qu'une fois la ponte achevée comme ça les poussins naissent en même temps et ils ont le même âge, plus facile à nourrir ils ont tous besoin de la même taille de proie en même temps. L'incubation dure environ 15 jours et les poussins restent au nid environ 20 jours. Le couple fait souvent une deuxième ponte, mais moins abondante, 8-10 si la première faisait 10-12. A la fin de la saison, les adultes sont épuisés, j'ai compté 1 nourrissage toutes les 2 minutes sur une nichée, c'est exceptionnel mais si vous observez un nid de ces oiseaux les adultes passent tout leur temps à nourrir leurs poussins. Vous imaginez bien qu'avec une telle fécondité la mortalité est élevée. On estime que plus de 60% des poussins envolés sont morts au printemps suivant. Et au moment de l'envol des mésanges, des prédateurs comme l'épervier qui ont eux aussi des becs à nourrir sont à l'affût de ces oiseaux inexpérimentés. Comme c'est souvent le cas, une telle fécondité s'accompagne d'une survie adulte faible. La majorité des mésanges adultes que vous voyez ont 1 à 2 ans, 4 ans c'est vieux, le record connu c'est 7 ans. C'est un stratégie r (voir cours de BCPST2 de biologie des populations).

Les mésanges adoptent facilement les nichoirs en bois. Il faut un diamètre du trou de 2,8 cm pour la bleue et 3,2 pour la charbonnière. A acheter auprès d'associations comme la LPO ou à faire soi-même (plans à la demande). Evitez les nichoirs des grandes surfaces qui ne sont pas tous corrects.